

REVELATEURS AU GENOL/HYDROQUINONE

	Révé en 2 bains			Glaflk p107 Standard	PG	D82	PV4	Lumière	Dillaye	L.P Clerc
Génol		5g - A		2g	1,75g	14g	0,25g	2g	1,5g	2g
Hydroquinone		2g - A		5g	4,35g	14g	0,25g	5g	12g	12g
Sulfite de soude		100g - A	100g - B	35g	45g	52,5g	25g	35g	50g	150g
Carbonate de soude			100g - B	25g	22g			25g	100g	60g
Carbonate de potasse										
Bromure de potassium			0,5g - B	1g	0,9g	9g	6g	1,5g	1,5g	
Acide citrique										
Métaborate de soude (Kodalk)										
Borax										
Bisulfite de soude		5g - A	0,01g - B			alcool méthylique 48cc				
Sucre		100g - A								
Iodure de potassium										
Métabisulfite de sodium										
Soude						9g	0,66g			
Eau QSPF		1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc
		Immersion dans A pendant 4mn puis 4 mn dans B La variation de dosage de sucre influe sur la Dmaxet sur le grain Rapidité du film doublée par une meilleure exploitation dea détails		Révé universel 5mn à 18°	11mn à 20°	4mn à 20°	gamma faible comme D76		formule de 18....	
					pour images sous-ex	pour images sous-ex	pour images sous-ex			
				Autre formule universelle		que quelques jours	formule Russe			
	AGFA 40	GEVAERT 201	GEVAERT 203	KODAK DK50	DK 50R	KODAK DK60a	KODAK D72	D76 / ID11	D76 / ID11 ent	Norme ASA
Génol	1,5g	1,5g	0,5g	2,5g	5g	2,5g	3g	2g	3g	1g
Hydroquinone	2,5g	6g	5g	2,5g	10g	2,5g	12g	5g	7,5g	2g
Sulfite de soude	18g	50g	50g	30g	30g	50g	45g	100g	100g	25g
Carbonate de soude		35g	35g				80g			3g
Carbonate de potasse	18g									0,4g
Bromure de potassium		2g	2g	0,5g		0,5g	2g			
Acide citrique			2g							
Métaborate de soude (Kodalk)				10g	40g	20g				eau distillée
Borax								2g	20g	privée d'air
Eau QSPF	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc		1000 cc
	Haut contraste film	diluer 1:4 6à8mn à 20° pour négas contrastés	révé à haut contraste non dilué 4mn à 20°	révé d'usage général 5 à 10mn à 20°		Révé d'usage général très doux compensateur	Révé universel diluer 1+2 / 5mn contraste élevé Formule proche du Dektol	LE classique		

REVELATEURS AU GENOL/HYDROQUINONE

	KODAK D11	KODAK D19	D19R	ID 36	ID 33	G 214	Glaflk p111
Génol	1g	2g	4,5g	1,5g	5g	2g	3g
Hydroquinone	9g	8g	17,5g	6,3g	8g	3g	1g
Sulfite de soude	75g	90g	90g	25g	50g	25g	40g
Carbonate de soude	30g	52g	52g	34,5g	37,5g	16g	
Carbonate de potasse							
Bromure de potassium	5g	5g		0,4g	5g	1g	
Métaborate de soude (Kodalk)			7,5g				
Borax							10g
Eau QSPF	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc
	donnent des images vigoureuses à réserver pour films art graphique Donne des noirs bruns - Si on augmente le bromure il donne des tons + chauds			diluer 1+1 3 à 5mn à 20° dilué1+3 6 à 10mn à 20°		pour négas en général	révé compensateur 12 à 20mn à 20°

Contraste variable Révélateur 2 bains	
A	B
Génol	8g
Hydroquinone	8g
Sulfite de soude	23g
Carbonate de soude	23g
Carbonate de potasse	20g
Bromure de potassium	1,1g
Eau QSPF	1000c
	1000cc
Contrastes faibles	élevés
A - 8 - 7 - 6 - 5 -	4 - 3 - 2
B - 0 - 1 - 2 - 3	4 - 5 - 14
eau - 8 - 8 - 8 - 8	8 - 8 - 0