

REVELATEURS FILMS

	AGFA 40	GEVAERT 210	Entretien Gevaert 210 R	Ilford ID2	Ilford ID19	ID 19R	D76 / ID11	D76R /ID11EN	KODAK D82
Génol	1,5g	0,6g	1,2g	2g	2,3g	4g	2g	3g	14g
Hydroquinone	2,5g	1,6g	3,5g	8g	8,8g	16g	5g	7,5g	14g
Sulfite de soude	18g	19g	8g	75g	72g	72g	100g	100g	52g
Carbonate de potasse	18g	4g	8g	43g	56g	56g			
Bromure de potassium		0,5g		2g	4g				8,8g
Bisulfite de soude (méta)									
Soude caustique						7,5g			8,8g
Borax							2g	20g	Alcool méthylique:48cc
Eau	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc	1000cc
	Haut contraste film	tous usages pour négas		diluer 1+5 6 à 12mn à 20°	durée très variable Révé haut contraste pour négas		LE classique		révé à haute énergie pour négas sous sous exposés ne se conserve pas

Révéléateur au pyrogallol ou acide pyrogallique	Glaflk p104	Glaflk p 104 ID1 Ilford		Ilford ID6
	A	A	Génol	0,8g
			Hydroquinone	3,4g
Bromure de potassium	1 g		Pyrogallol	0,6g
Métabisulfite de sodium	10 g		Sulfite de soude	8,8g
ou de potassium		25 mg	Carbonate de potasse	22,5
Pyrogallol	60 g	100 g	Bromure de potassium	0,05g
Eau	1 L	1 L	Bisulfite de soude (méta)	10g
			Eau	1000cc
	B	B		G214
Sulfite de sodium anhydre	100 g	50 g	Génol	2g
Eau	1 L		Hydroquinone	3g
			Sulfite de soude	25g
	C		Carbonate de potasse	16g
Carbonate de sodium anhydre	75 g	37,5 g	Bromure de potassium	1g
Eau	1 L	1 L	Bisulfite de soude (méta)	
Prendre A + B + C et 11 volumes d'eau 12mn à 18° pour la 1ère Prendre 10A + 9B 3 à 6 mn à 20° pour l'ID1			Soude caustique	
			Borax	
			Eau	1000cc