

Haut contraste

| | AGFA 40 | Ilford ID19 | ID 19R | KODAK D11 | KODAK D19 | D19R | ID2 | DEKTOL | Kodak D154 | Ilford ID55 | |
|----------------------------|---------------------|--|--|--|-------------------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------|--|
| Génol | 1,5g | 2,3g | 4g | 1g | 2g | 4,5g | 7g | 3g | 1,25g | 3g | |
| Hydroquinone | 2,5g | 8,8g | 16g | 9g | 8g | 17,5g | 8g | 12g | 6g | 12,5g | |
| Sulfite de soude | 18g | 72g | 72g | 75g | 90g | 90g | 75g | 45g | 22,5g | 50g | |
| Carbonate de potasse | 18g | | | | 52g | 52g | | | | | |
| Bromure de potassium | | 4g | | 5g | 5g | | 2g | 2g | 0,5g | 1,5g | |
| Carbonate de soude | | 56g | 56g | 30g | | | 37,5g | 67,5g | 30g | 72g | |
| Soude caustique | | | 7,5g | | | 7,5g | | | | | |
| Métabisulfite de potassium | | | | | | | | | | | |
| Borax | | | | | | | | | | | |
| Acide borique | | | | | | | | | | | |
| Eau | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | |
| | Haut contraste film | Révé haut contraste très variable | | Révé à contraste élevé d'usage non dilué 4 à 5mn à 20° | Révé contraste d'usage généra | | diluer à 1+2 | appelé aussi D72 4mn à 20° | 2 à 3mn à 18° | 1,3 à 2mn à 20° | |
| | Kodak D11 | ILFORD ID13 | KODAK D8 | Glafkidès | LP Clerc | AGFA 120 | AGFA 123 | Gevaert G226 | Kodak D8 | Agfa 2 G220 -ID 13 | |
| Génol | 12g | | | | | | | | | | |
| Hydroquinone | 9g | 25g - A | 45g | 4,4g | 4,4g | 8g | 24g | 24g | 25g | 45g | |
| Sulfite de soude | 75g | | 90g | 20g | 120g | 80g | 60g | 60g | 30g | 90g | |
| Carbonate de potasse | | | | | | 80g | | | | | |
| Bromure de potassium | 5g | 25g - A | 30g | 0,5g | | | | 25g | 4g | 30g | |
| Carbonate de soude | 25g | | | | 20 | | 80g | 80g | 50g | | |
| Soude caustique | | 50g - B | 37g | | | | | | | 37,5g | |
| Métabisulfite de potasse | | 25g - A | | | | | | | 10g | 12,5g | |
| Borax | | | | 10g | | | | | | | |
| Acide borique | | | | 5g | | | | | | | |
| Eau | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | 1000cc | |
| | 5,3mn à 20° | Révé à très haut contraste eau distillée Mélanger A & B à parts égales 2 à 3mn à 20° | Révé à très haut contraste + 1 part d'eau 2mn à 20° pour le Kodalith | Révés à haut contraste | | | Révé doux papier diluer 1:2 à 1:5 | spécial Portriga diluer 1:2 à 1:5 | 3,3 à 4 mn à 20° | révé contraste maximum 2mn à 18° | mélanger à un bain de 25gde potasse caustique dans 500ml eau 2 à 3mn à 18° |